

* 定期予防接種の種類



令和4年度予防接種のご案内




区分	種類	対象年齢		接種回数及び接種間隔及び注意事項		
		* 好ましい接種年齢		* 好ましい接種間隔		
生ワクチン	BCG	1歳のお誕生日前日まで * 5か月～8か月未満		1回		
	MR 麻しん・風しん混合又は 風しん・麻しん単独	1期	1歳～2歳のお誕生日前日まで	1回		
		2期	小学校就学前の1年間（年長児） （H28.4.2生～H29.4.1生）	1回	接種期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで	
	水痘（水ぼうそう）	1歳～3歳のお誕生日の前日まで * 12か月～15か月未満		2回	3か月以上の間隔をあけて2回接種 * 1回目接種後6か月～12か月までの間隔をあけて2回目を接種	
	ロタウイルス	1価	生後6週0日～24週0日 初回接種は生後2か月から生後14週6日まで	2回	* 27日以上の間隔をあけて2回接種（ロタリックス）	
	5価	生後6週0日～32週0日 初回接種は生後2か月から生後14週6日まで	3回	* 27日以上の間隔をあけて3回接種（ロタテック）		
不活化ワクチン	(ヒブ) Hib インフルエンザ菌b型	接種開始年齢の月(年)	2か月～7か月未満	4回	初回接種 3回	生後12か月未満までに27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をあけて3回〔初回2回目及び3回目の接種は、生後12か月以上の場合は受けられない。（追加接種は可能）〕 * 27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上56日までの間隔をあけて3回
				追加接種 1回	初回接種終了後7か月以上の間隔をあけて1回。ただし、初回接種3回を終了せずに生後12か月以上になった場合は、初回接種に係る最後の接種終了後27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をあけて1回 * 初回接種終了後、7か月以上13か月までの間隔をあけて1回	
			7か月～12ヶ月未満	3回	初回接種 2回	生後12か月未満までに27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をあけて2回〔初回2回目は、生後12か月以上の場合は受けられない。（追加接種は可能）〕 * 27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上56日までの間隔をあけて2回
					追加接種 1回	初回接種終了後7か月以上の間隔をあけて1回。ただし、初回接種2回を終了せずに生後12か月以上になった場合は、初回1回目の接種終了後27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をあけて1回 * 初回接種終了後、7か月以上13か月までの間隔をあけて1回
	1歳～5歳のお誕生日前日まで		1回			
	小児用肺炎球菌	接種開始年齢の月(年)	2か月～7か月未満	4回	初回接種 3回	生後24か月未満までに27日以上の間隔をあけて3回〔初回2回目及び3回目の接種は、生後24か月以上は受けられない。また、生後12か月以上で初回2回目を受けた場合は、初回3回目の接種は受けられない。（追加接種は可能）〕 * 生後12か月未満までに27日以上の間隔をあけて3回
					追加接種 1回	初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12か月以上になって1回 * 初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12か月から15か月までの間に1回
			7か月～12か月未満	3回	初回接種 2回	生後24か月未満までに27日以上の間隔をあけて2回〔初回2回目の接種は生後24か月以上は受けられない。（追加接種は可能）〕 * 生後12か月未満までに27日以上の間隔をあけて2回
					追加接種 1回	初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12か月以上になって1回 * 初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて生後12か月になって1回
			1歳～2歳のお誕生日前日まで		2回	60日以上の間隔をあけて2回
			2歳～5歳のお誕生日前日まで		1回	
	B型肝炎	1歳のお誕生日の前日まで * 2か月～9か月未満		3回	初回接種後27日の間隔をあけて2回目、初回接種後139日以上あけて3回目を接種 * 生後2か月から1歳のお誕生日の前日までに3回	
	四種混合 ジフテリア・百日咳 ポリオ・破傷風 ポリオ単独	1期	初回	3か月～7歳6か月の前日まで * 3か月～12か月未満	3回	20日以上の間隔をあけて3回 * 20日から56日までの間隔をあけて3回
			追加	3か月～7歳6か月の前日まで	1回	1期初回終了後、6か月以上の間隔をあけて1回 * 1期初回3回終了後12か月から18か月までの間隔をあけて1回
	二種混合 ジフテリア・破傷風	2期	11歳～13歳のお誕生日前日まで * 11歳～12歳未満		1回	
	日本脳炎	1期	初回	6か月～7歳6か月の前日まで * 3歳～4歳未満	2回	6日以上の間隔をあけて2回 * 6日から28日までの間隔をあけて2回
			追加	6か月～7歳6か月の前日まで * 4歳から5歳未満	1回	1期初回終了後、6か月以上の間隔をあけて1回 * 1期初回2回目終了後、標準的にはおおむね1年（11か月～13か月）の間隔をあけて1回
		2期	9歳～13歳のお誕生日前日まで * 9歳～10歳未満		1回	
	子宮頸がん (HPV ワクチン)	小学6年生～高校1年生 (H18.4.2～H23.4.1生まれの女子)			3回	2価（サーバリックス） 1か月以上の間隔をあけて2回接種した後、1回目接種から5か月以上 かつ、2回目の接種から2か月半以上の間隔をあけて1回 * 1か月以上の間隔をあけて2回接種した後、1回目の接種から、6か月の間隔をあけて1回
		* 中学1年生			3回	4価（ガーダシル） 1か月以上の間隔をあけて2回接種した後、3か月以上の間隔をあけて1回 * 2か月以上の間隔をあけて2回接種した後、1回目の接種から、6か月の間隔をあけて1回

注意：予防接種の開始時期・接種間隔については、必ず主治医との相談をお願いします。

予防接種を受ける時の注意事項

- ①対象年（月）齢になったら早めに接種しましょう。
- ②協力医療機関で接種すれば料金は無料です。（年齢対象外は有料です。）
- ③協力医療機関で接種する場合は、事前に予約が必要です。
- ④体調の良いときに、お子様の健康状態をよく知っている保護者が連れていきましょう。
- ⑤母子健康手帳、健康保険証等をお持ちください。
- ⑥予診票は協力医療機関に備え付けています。
- ⑦予防接種を受ける前に、母子健康手帳を交付の際にお渡しした「予防接種と子どもの健康」の冊子を必ずお読みください。
- ⑧予防接種の種類が増えています。必ずよく確認してください。

異なるワクチン（初回）の接種間隔



接種についての注意事項

- 日本脳炎について
接種回数は4回必要です。
(1) H7.4.2生～H19.4.1生の人、接種年齢が20歳の誕生日前日までにになりました。20歳の誕生日の前日までに1期・2期分を定期の予防接種として接種出来ますので不足の回数を接種してください。
- (2) H19.4.2～H21.10.1生の人、平成22年3月31日までに日本脳炎の1期が終了していない人は、6か月～7歳6か月になる前日まで、または9歳以上13歳になる誕生日の前日までに不足の回数を接種してください。（不足の回数については、母子手帳でご確認ください）

- 子宮頸がんワクチンについて
積極的勧奨の差し控えにより、接種出来なかった人
H9.4.2～H18.4.1生まれの女子が接種対象者です。

差し控え対象者の接種期間

R4.4.1～R7.3.31

この期間を過ぎると有料になります。
ご注意ください。

詳しくは、福岡県ホームページ「子宮頸がん予防について」
www.pref.fukuoka.lg.jpをご覧ください。

- 長期にわたり療養を必要とする疾病（厚生労働省が定めた疾病等）にかかった等特別な事情がある人
当該事情がなくなった日から起算して原則として2年を経過する日までの間（ワクチンの種類により、期間や対象年齢が異なります。）で定期予防接種として予防接種が受けられます。詳しくは川崎町保健センターまでお問い合わせください。

予防接種に関するお問い合わせ先

* 川崎町保健センター

電話 72-7083

* 川崎町役場 代表

電話 72-3000

内線（478・479）

